

STELLINGEN

I

Endemische treponematosen bestaan nog steeds; hernieuwde aandacht is noodzakelijk.

II

De belangrijkste hulpmiddelen bij het onderscheid tussen syfilis en endemische treponematosen blijven klinische, anamnestiche en epidemiologische gegevens.

III

De screening van zwangere vrouwen op syfilis dient gehandhaafd te blijven.

IV

Met behulp van radiodiagnostische technieken is onderscheid tussen syfilis en framboesia tropica niet mogelijk
(Engelkens, Ginai, Jubianto Judanarso, Stolz. *Skeletal Radiology* 1992;21:194-197).

V

Bij voorlichtingscampagnes blijft behalve aandacht voor AIDS ook aandacht voor de overige seksueel overdraagbare aandoeningen essentieel.

VI

Genitale ulcera kunnen de vatbaarheid voor infectie met het humane immunodeficiëntie virus verhogen.

VII

De juiste venereologische diagnose is in het algemeen niet door de onderbroek heen te stellen.

VIII

Gemene gevolgen van gemeenschap in onze gemeenschap worden dagelijks op drempelvrije poliklinieken gezien.

IX

Het omroepen van namen van patiënten blijft op verschillende poliklinieken minder gewenst.

X

Het blijft verwonderlijk en frustrerend dat maanwandelingen tot de mogelijkheden behoren, terwijl psoriasis nog niet definitief te genezen valt.

XI

Bijsluiters veroorzaken dikwijls onnodige angst en dientengevolge therapie-ontrouw.

XII

Het feit dat voor verschillende in Nederland practizerende, niet reguliere 'genezers' geen strenge diploma eisen bestaan, getuigt van het geringe inzicht van politiek Den Haag in de belangen van de patiënt en van de volksgezondheidszorg in het algemeen.

XIII

Verschiedende recente Nederlandse postzegel-emissies fungeren helaas niet als visitekaartje voor het land.

XIV

Beleefdheid dient zo spoedig mogelijk, waar nodig, in de samenleving gereïntroduceerd te worden.

Stellingen bij het proefschrift:

'Syphilis and the Endemic Treponematoses.
Clinical, (Histo-) Pathological and Laboratory Studies'.

H.J.H.ENGELKENS

Rotterdam, 17 maart 1993.